

G ö t t i n g i s c h e
gelehrte Anzeigen

unter der Aufsicht
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

Der erste Band

auf das Jahr 1805.



G ö t t i n g e n ,
gedruckt bey Heinrich Dieterich.

Göttingische gelehrte Anzeigen

unter der Aufsicht
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften;

29. Stück.

Den 21. Februar 1805.

Göttingen.

Die königl. Societät der Wissenschaften hat von einem ihrer auswärtigen Mitglieder, dem um die Erweiterung und um das solide Studium der Naturgeschichte so vielseitig verdienten Hrn. Ritter Thunberg zu Uppsala, handschriftliche Illustrationes generum aliquot insectorum *coleoptratorum* erhalten, worin dieser scharfsichtige Veteran verschiedene Schwierigkeiten und Anstoß in den bisherigen entomologischen Systemen dadurch sehr glücklich hebt, daß er einige Gattungen (Species) von seltsam gebildeten, meist Südamericanischen, käferartigen Insecten aus denjenigen Geschlechtern, denen sie bisher beigesellt worden waren, herausnimmt, und sie zu vier besondern generibus erhebt; wozu sie durch die auszeichnenden Eigenheiten ihres Baues vollkommen qualificirt, und hingegen von den übrigen Gattungen derjenigen Geschlechter, in welche sie vorher gleichsam eingezwängt worden waren, auffallend verschieden sind. Diese neuen genera sind nun folgende:

I. MACROGASTER: *Antennae lanceolatae, medio crassiores. Elytra abbreviata.*

§ (2)

Die Gattung *M. abbreviatus*, nämlich die bisherige *Necydalis brevicornis* LINN. (*Lymexylon abbreviatum* FABR.) mit ihren lanzettförmigen Fühlhörnern und langgestrecktem Hinterleibe mit so sehr kurzen Flügeldecken.

II. *MACROPUS*: *Antennae* setaceae. *Thoracis spina lateralis, solitaria, globosa, mobilis.*

Die Gattung *M. longimanus*, der abenteuerliche *Cerambyx longim.* LINN. (*Prionus longim.* FABR.) mit dem in seiner Art einzigen, beweglich eingelenkten, Dorn an den Seiten des Brustschildes, und den ungeheuer langen Vorderbeinen.

III. *PACHYMERUS*: *Antennae* filiformes, serratae. *Femora postica incrassata.*

Die Gattung *P. bactris*, der sonstige *Bruchus bactris*, mit den großen gewölbten Hinterschenkeln.

IV. *CHALEPUS*: *Antennae* moniliformes. *Thorax* teres, immarginatus, antice angustatus. *Elytra* rugoso-scabra.

Begreift mehrere Gattungen, theils bekannte, die nur zeither unter dem Geschlecht *Hispa* standen, wie z. B. *Ch. sanguinolus*, theils aber auch folgende neu hinzugekommene:

Ch. collaris: caerulea capite thoraceque rubris.

Ch. lineata: fusca capite thorace lineaque elytrorum rubris.

Ch. rubra: tota rubra oculis nigris.

Ch. dorsalis: capite nigro, thorace elytrisque rubris: futura nigra.

Ch. rufogaster: nigra thorace abdomineque rubris.

Braunschweig.

Bei Karl Reichard: *Anleitung für Anfänger in der Diplomantik*, von Justus von Schmidt, genannt Phisfeldeck, Herzogl. Braunschweig-